

# ВАРАТРАЗ

## Состав:

1 мл антипаразитарного раствора содержит:

Amitraz - 150 мг, вспомогательные вещества (алкилбензолсульфонат, триэтанолламин,

Полисорбат 80, изопропиловый спирт, Xilen) - 100 мг

## Показания к применению:

VARATRAZ рекомендуется для **лечения варроатоза** у пчел. Он используется посредством фумигации через леток, на все ульи, в течение всего активного сезона. Самое эффективное лечение - осенью, когда в ульях нет расплода. Первая процедура лечения проводится весной и повторяется через 10 дней. Следующая

обработка проводится после извлечения акациевого меда, и затем после извлечения липового меда.

Следующая процедура лечения проводится в августе, после сбора меда подсолнечника. Осенью проводятся три процедуры каждые 7-10 дней. Чтобы убедиться, что клещ варроа не остался в ульях, очень важно, чтобы по крайней мере последняя осенняя обработка была выполнена в отсутствии расплода.

Обработка проводится только при температуре выше 12°C (рекомендуемый температурный диапазон для 14-18°C), и когда пчелы не роятся. Лечение проводится, когда большинство пчел находятся в улье (утром или в сумерках).

## Дозировка и способ применения:

Продукт (в жидкой форме) забирается пипеткой, с которой капается на картонную ленту с равным расстоянием между каплями.

- многокорпусный улей (Рута): 5,5 - 6 мг / 2 капли - один корпус улья;

- улей Дадан: 8,5 - 9 мг / 3 капли - один корпус улья;

- горизонтальный улей: 14,25 - 15 мг / 5 капель - один корпус улья.

Если семьи были собраны на зимовку и разделены перегородкой, то количество используемого VARATRAZ будет следующим:

- многокорпусный улей (Рута): 2,5 - 3 мг / 1 капля - половина улья;

- улей Дадан: 5,5 - 6 мг / 2 капли - две трети улья;

- горизонтальный улей: 8,5 - 9 мг / 3 капли - половина корпуса улья.

Если в горизонтальном улье есть два семейства, каждому надо применить 3 капли VARATRAZ.

Для полного сжигания картонной полоски, полоску надо согнуть по длине или сложить «веером».

Картонную полоску следует поджечь с обоих концов, вставить (без пламени) в улей через леток, который надо немедленно закрыть максимум на 15 минут.

## Меры предосторожности:

VARATRAZ следует использовать только для лечения варроатоза у пчел. Не применять с другими противопаразитарными средствами. Не увеличивать количество капель VARATRAZ по сравнению с предписанными дозами, не увеличивать время закрытия летка, соблюдать температурный режим, иначе нарушение данных условий может привести к отравлению пчел.

Мед, собранный во время лечения с помощью VARATRAZ, нельзя употреблять.

## Условия хранения:

Хранить в оригинальной, хорошо закрытой упаковке в сухих помещениях, при температуре от +15°C до +25°C, вдали от открытого огня и прямого солнечного света.

Срок годности упакованного и не открытого средства: 2 года.

Срок годности после первого открытия упаковки: 12 месяцев.

## Упаковка:

Бутылки из коричневого стекла с предохранительной пробкой и пипеткой, с 10 мл антипаразитарного раствора, 50 картонных полосок для фумигации, листовка с инструкцией по использованию.